

Sur la présence de *Brachyderes grisescens* Fairmaire, 1862 en France  
(Coleoptera Curculionidae)

Dans un récent article paru dans *L'Entomologiste* [GERMANN, 2008], l'un d'entre nous signalait la présence du Curculionide *Brachyderes grisescens* Fairmaire en abondance à proximité du restauroute « Béziers-Montblanc », près de la ville de Béziers, dans l'Hérault. En fait, cette espèce avait déjà été capturée en France par les enfants d'un autre d'entre nous (RD) en juin 2001, mais à Lacanau-Océan, en Gironde, c'est-à-dire sur les rives de l'Atlantique [DELALANDRE & VOISIN, 2006]. Espèce à l'origine ibéro-marocaine, *B. grisescens* a récemment été trouvé en Italie, Toscane et Latium [ABBAZZI & CUOCO, 2004], et on peut s'attendre à le découvrir en d'autres localités hors de son aire d'origine. Nos captures sembleraient indiquer que l'espèce s'étend actuellement en France selon deux voies, une suivant la côte méditerranéenne jusqu'en Italie, et l'autre le long de la côte atlantique.

Un tableau de détermination des *Brachyderes* de la faune française est donné dans DELALANDRE & VOISIN [2006].

Références bibliographiques

- DELALANDRE R. & VOISIN J.-F., 2006. – *Brachyderes grisescens*, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera, Curculionidae). *Le Coleoptériste*, 9 : 37-39.
- GERMANN C. 2007. – *Brachyderes grisescens* Fairmaire, 1862, espèce nouvelle pour la faune française (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *L'Entomologiste*, 63 : 225-226.
- ABBAZZI P. & CUOCO S. 2004. – *Brachyderes (Brachyderes) grisescens* specie nuova per la fauna italiana (Coleoptera, Curculionidae). *Bolletino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 59 : 89-92.

Robert DELALANDRE  
La Rochette, Cublac  
F-19520 Mansac

Christoph GERMANN  
Mittlere Strasse 14  
CH-3600 Thun

Jean-François VOISIN  
UMS 305, Muséum national d'Histoire naturelle  
CP 51 (Mammifères et Oiseaux), 57 rue Cuvier  
F-75005 Paris